

Normtal 2014

Hanne Damgaard Poulsen (ed.): Normtal for husdyrgødning –2014, 33 sider.

<http://anis.au.dk/normtal/>

NB:

Udskillelsen af kvælstof (af dyr) er angivet som total med fordelingen på fast gødning og urin i parentes.

Emissionen af ammoniak er angivet som total i stald og lager samt bidrag fra stald henholdsvis lager i parentes.

Indholdet af $\text{NH}_4\text{-N}$ er beregnet ud fra gødningens indhold af total N samt de NH_4 -procenter, der er angivet i DJF-rapport Husdyrbrug, nr. 36, 2001.

Vær opmærksom på, at værdierne for volumen og tørstofprocenter er vejledende værdier, idet der kan være store variationer i praksis som følge af forskellig håndtering.

Slagtesvin, 1 stk. produceret,
 76 kg tilvækst
 (31 kg til 107 kg levende vægt =
 31 kg til 82 kg slagtevægt)
 (levende vægt = 1,31* slagtevægt)

Forudsætninger:
 Tilvækst 76 kg
 FE_s pr. kg tilvækst 2,85FE_s
 Råprotein pr. FE_s 147,2 g
 Fosfor pr. FE_s 4,8 g

Ab dyr, udskilt i alt:
 Mængde 0,48 ton
 N 2,85 kg (0,97+1,88)
 P 0,62 kg
 K 1,35 kg

Mængden ab lager Staldsystem	Gødningstype	Ton gødning	Tørstof, pct.	Indhold i alt				Indhold pr. ton gødning				Emission
				Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K	Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K	Kg N (ammoniak)
Delvis spaltegulv med 50-75% fast gulv	Gylle	0,52	6,6	2,58	1,93	0,623	1,39	4,96	3,72	1,20	2,66	0.29 (0.24+0.04)
Delvis spaltegulv med 25-49% fast gulv	Gylle	0,52	6,6	2,51	1,88	0,623	1,39	4,82	3,61	1,20	2,66	0.36 (0.32+0.04)
Fuldspaltegulv	Gylle	0,52	6,1	2,36	1,77	0,622	1,35	4,52	3,39	1,19	2,58	0.49 (0.45+0.04)
Drænet gulv + spalter (33/67)	Gylle	0,52	6,1	2,42	1,81	0,622	1,35	4,62	3,47	1,19	2,58	0.43 (0.40+0.04)
Fast gulv	Staldgødning	0,10	23,0	0,93	0,32	0,480	0,70	9,31	3,26	4,82	7,08	0.90 (0.51+0.39)
	Ajle	0,34	2,0	0,93	0,84	0,149	0,81	2,75	2,48	0,44	2,39	
Dybstrøelse, opdelt lejeareal	Dybstrøelse	0,09	33,0	0,96	0,24	0,331	1,11	11,20	2,80	3,85	12,95	0.52 (0.38+0.14)
	Gylle	0,33	4,9	1,24	0,93	0,311	0,67	3,80	2,85	0,95	2,07	
Dybstrøelse	Dybstrøelse	0,17	33,0	1,92	0,48	0,662	2,23	11,20	2,80	3,85	12,95	0.67 (0.43+0.24)

Korrektion for afvigende vægtinterval:

Der korrigeres med følgende faktor:

for kvælstof: (slutvægt – startvægt) x (13,777+ 0,1731 x (slutvægt + startvægt)) / 2852

for fosfor: (slutvægt – startvægt) x (4,10 + 0,0296 x (slutvægt + startvægt)) / 622

Korrektion af kvælstofmængde ved afvigende fodermængde og -sammensætning:

Der korrigeres med følgende faktor:

((kg foder pr. produceret gris x kg N pr. kg foder) - ((afgangsvægt - indgangsvægt) x 0,0296 kg N pr. kg tilvækst)) / 2,852

eller ((FE_{sv} pr. produceret svin x g råprotein pr. FE_{sv} /6250) - ((afgangsvægt - indgangsvægt) x 0,0296 kg N pr. kg tilvækst)) / 2,852

Korrektion af fosformængde ved afvigende fodermængde og -sammensætning:

Der korrigeres med følgende faktor:

((kg foder pr. produceret gris x kg P pr. kg foder) - ((afgangsvægt - indgangsvægt) x 0,0055 kg P pr. kg tilvækst)) / 0,622

eller ((FE_{sv} pr. produceret svin x g fosfor pr. FE_{sv} /1000) - ((afgangsvægt - indgangsvægt) x 0,0055 kg P pr. kg tilvækst)) / 0,622

1 årsso med 29,6 grise til 7,1 kg

Normalt fordeler foderforbruget fra en årsso sig med 70% i løbe- og drægtighedsstalden og 30% i farestalden. Gødningsproduktionen er derfor opdelt på et bidrag fra løbe- og drægtighedsstalden og et bidrag fra farestalden. De to bidrag adderes for at få produktionen fra 1 årsso.

Forudsætninger:

FE _s pr. årsso	1650
Råprotein pr. FE _s	133,1 g
Fosfor pr. FE _s	4,9 g
Fravænningsalder	28 dage

Ab dyr (total), udskilt pr. årsso:

Mængde	3,96 ton
N	25,2 kg (6,5+18,7)
P	5,66 kg
K	10,1 kg

Bidrag fra løbe- og drægtighedsstald:

Mængden ab lager		Ton gødning	Tørstof, pct.	Indhold i alt				Indhold pr. ton gødning				Emission
Staldsystem	Gødningstype			Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K	Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K	Kg N (ammoniak)
Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	Gylle	4,05	4,5	15,66	11,74	3,962	7,05	3,87	2,90	0,98	1,74	1.98 (1.70+0.28)
Individuel opstaldning, fuldspaltegulv	Gylle	4,05	4,5	14,89	11,17	3,962	7,05	3,68	2,76	0,98	1,74	2.75 (2.49+0.26)
Individuel opstaldning, fast gulv	Staldgødning	0,53	23,0	4,52	1,58	2,524	3,25	8,59	3,01	4,80	6,18	4.71 (2.75+1.96)
	Ajle	1,77	2,5	7,95	7,16	1,472	4,55	4,50	4,05	0,83	2,58	
Løsgående, dybstrøelse + spaltegulv	Dybstrøelse	0,67	33,0	4,78	1,19	1,469	5,84	7,08	1,77	2,18	8,65	2.82 (2.28+0.55)
	Gylle	2,22	5,5	10,23	7,68	2,655	4,72	4,61	3,46	1,20	2,13	
Løsgående, dybstrøelse + fast gulv	Dybstrøelse	0,67	33,0	4,78	1,19	1,469	5,84	7,08	1,77	2,18	8,65	3.08 (2.54+0.54)
	Gylle	2,22	5,5	9,98	7,48	2,655	4,72	4,50	3,37	1,20	2,13	
Løsgående, dybstrøelse	Dybstrøelse	1,79	33,0	14,01	3,50	4,378	16,08	7,84	1,96	2,45	8,99	3.71 (2.65+1.06)
Løsgående, delvis spaltegulv	Gylle	4,76	4,5	15,44	11,58	3,985	7,55	3,24	2,43	0,84	1,58	2.37 (2.09+0.27)

Korrektion af kvælstofmængde ved afvigende foder mængde og -sammensætning:

Der korrigeres relativt med følgende faktor:

$((\text{kg foder pr. årsso} \times \text{kg N pr. kg foder}) - 1,98 - (\text{antal fravænnede grise pr. årsso} \times \text{fravænningsvægt} \times 0,0257 \text{ kg N pr. kg tilvækst})) / 25,2$

eller $((\text{FE pr. årsso} \times \text{g råprotein pr. FE} / 6250) - 1,98 - (\text{antal fravænnede grise pr. årsso} \times \text{fravænningsvægt} \times 0,0257 \text{ kg N pr. kg tilvækst})) / 25,2$

Korrektion af fosformængde ved afvigende foder mængde og -sammensætning:

Der korrigeres relativt med følgende faktor:

$((\text{kg foder pr. årsso} \times \text{kg P pr. kg foder}) - 0,58 - (\text{antal fravænnede grise pr. årsso} \times \text{fravænningsvægt} \times 0,006 \text{ kg P pr. kg tilvækst})) / 5,66$

eller $((\text{FE pr. årsso} \times \text{g P pr. FE} / 1000) - 0,58 - (\text{antal fravænnede grise pr. årsso} \times \text{fravænningsvægt} \times 0,006 \text{ kg P pr. kg tilvækst})) / 5,66$

Bidrag fra farestald:

Mængden af lager Staldsystem	Gødningstype	Ton gødning	Tørstof, pct.	Indhold i alt				Indhold pr. ton gødning				Emission
				Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K	Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K	Kg N (ammoniak)
Kassestier, delvis spaltegulv	Gylle	1,72	4,5	6,71	5,03	1,698	3,02	3,91	2,93	0,99	1,76	0.85 (0.73+0.12)
Kassestier, fuldspaltegulv	Gylle	1,72	4,5	6,00	4,50	1,698	3,02	3,49	2,62	0,99	1,76	1.56 (1.46+0.10)
Friland, fareperiode		1,29	7,7	8,33	0,00	1,874	3,27	6,48	0,00	1,46	2,55	

1 smågris, 7,1 - 31 kg

Forudsætninger:

Tilvækst	23,9 kg
FE _s pr. kg tilvækst	1,95
Råprotein pr. FE _s	162,6 g
Fosfor pr. FE _s	5,2 g

Ab dyr, udskilt i alt:

Mængde	0,09 ton
N	0,49 kg (0,20+0,29)
P	0,13 kg
K	0,27 kg

Mængden ab lager Staldsystem	Gødningstype	Ton gødning	Tørstof, pct.	Indhold i alt				Indhold pr. ton gødning				Emission
				Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K	Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K	Kg N (ammoniak)
Toklimastald, delvis spaltegulv	Gylle	0,133	5,0	0,45	0,34	0,126	0,29	3,42	2,57	0,95	2,16	0.04 (0.03+0.01)
Fuldspaltegulv	Gylle	0,127	4,6	0,41	0,31	0,125	0,27	3,24	2,43	0,99	2,16	0.08 (0.07+0.01)
Drænet gulv + spalter (50/50)	Gylle	0,132	4,4	0,42	0,31	0,125	0,27	3,16	2,37	0,95	2,07	0.07 (0.06+0.01)
Fast gulv	Staldgødning	0,018	23,0	0,16	0,06	0,098	0,14	9,08	3,18	5,39	7,79	0.18 (0.11+0.07)
	Ajle	0,072	1,9	0,12	0,11	0,029	0,16	1,74	1,56	0,40	2,28	
Dybstrøelse	Dybstrøelse	0,026	33,0	0,30	0,08	0,133	0,44	11,46	2,86	5,03	16,56	0.13 (0.07+0.05)

Korrektion for afvigende vægtinterval:

Der korrigeres relativt med følgende faktor:

for kvælstof: $(\text{slutvægt} - \text{startvægt}) \times (13,777 + 0,1731 \times (\text{slutvægt} + \text{startvægt})) / 486$

for fosfor: $(\text{slutvægt} - \text{startvægt}) \times (4,10 + 0,0296 \times (\text{slutvægt} + \text{startvægt})) / 125$

Korrektion af kvælstofmængde ved afvigende foder mængde og -sammensætning:

Der korrigeres relativt med følgende faktor:

$((\text{kg foder pr. produceret gris} \times \text{kg N pr. kg foder}) - ((\text{afgangsvægt} - \text{fravænningsvægt}) \times 0,0304 \text{ kg N pr. kg tilvækst})) / 0,486$

eller $((\text{FE}_{\text{sv}} \text{ pr. produceret gris} \times \text{g råprotein pr. FE}_{\text{sv}} / 6250 - ((\text{afgangsvægt} - \text{fravænningsvægt}) \times 0,0304 \text{ kg N pr. kg tilvækst})) / 0,486$

Korrektion af fosformængde ved afvigende foder mængde og -sammensætning:

Der korrigeres relativt med følgende faktor:

$((\text{kg foder pr. produceret gris} \times \text{kg produceret gris} \times \text{kg P pr. kg foder}) - ((\text{afgangsvægt} - \text{fravænningsvægt}) \times 0,0049 \text{ kg P pr. kg tilvækst})) / 0,125$

eller $((\text{FE}_{\text{sv}} \text{ pr. produceret gris} \times \text{g P pr. FE}_{\text{sv}} / 1000) - ((\text{afgangsvægt} - \text{fravænningsvægt}) \times 0,0049 \text{ kg P pr. kg tilvækst})) / 0,125$

1 årsko, tung race

Forudsætninger:

Mælkeydelse, kg mælk/årsko	9496
Mælkeprotein, kg/årsko	323
Mælkeprotein, %	3,40
FE pr. årsko	7053

Råprotein, g pr. FE	172
Ford. råprotein, g pr. FE	128
Fosfor, g pr. FE	4,15
Fodereffektivitet, %	83,0

Ab dyr, udskilt i alt:

Mængde	24,6 ton
N	141,7 kg (76,0+65,7)
P	19,7 kg
K	90,5 kg

Mængden ab lager Staldsystem	Gødningstype	Ton gødning	Tørstof, pct.	Indhold i alt				Indhold pr. ton gødning				Emission
				Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K	Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K	Kg N (ammoniak)
Bindestald med grebning	Staldgødning	11,13	20,0	66,79	16,70	17,933	28,25	6,00	1,50	1,61	2,54	11.89 (6.57+5.32)
	Ajle	14,23	3,4	57,13	51,42	1,984	67,71	4,01	3,61	0,14	4,76	
Bindestald med riste	Gylle	29,46	8,7	137,56	82,54	19,916	95,96	4,67	2,80	0,68	3,26	6.04 (3.94+2.10)
Sengestald med fast gulv	Gylle	29,24	8,0	127,44	76,46	19,748	92,30	4,36	2,62	0,68	3,16	14.93 (13.14+1.79)
Sengestald med spalter (kanal, line-spil)	Gylle	29,24	8,0	132,51	79,51	19,748	92,30	4,53	2,72	0,68	3,16	9.85 (7.89+1.97)
Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Gylle	29,24	8,0	129,98	77,99	19,748	92,30	4,45	2,67	0,68	3,16	12.39 (10.52+1.88)
Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb *)	Gylle	29,24	8,0	135,05	81,03	19,748	92,30	4,62	2,77	0,68	3,16	7.31 (5.26+2.06)
Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	15,68	30,0	147,60	29,52	22,195	145,40	9,41	1,88	1,42	9,27	10.10 (8.50+1.59)
Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse	12,38	28,7	92,78	18,56	13,908	100,05	7,49	1,50	1,12	8,08	12.08 (10.36+1.72)
	Gylle	12,81	6,9	50,73	30,44	7,865	36,19	3,96	2,38	0,61	2,83	
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)	Dybstrøelse	12,38	28,7	92,78	18,56	13,908	100,05	7,49	1,50	1,12	8,08	10.05 (8.26+1.79)
	Gylle	12,81	6,9	52,76	31,65	7,865	36,19	4,12	2,47	0,61	2,83	
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Dybstrøelse	12,38	28,7	92,78	18,56	13,908	100,05	7,49	1,50	1,12	8,08	11.06 (9.31+1.75)
	Gylle	12,81	6,9	51,74	31,05	7,865	36,19	4,04	2,42	0,61	2,83	
Dybstrøelse, lang ædeplads, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	Dybstrøelse	12,38	28,7	92,78	18,56	13,908	100,05	7,49	1,50	1,12	8,08	9.03 (7.21+1.82)
	Gylle	12,81	6,9	53,77	32,26	7,865	36,19	4,20	2,52	0,61	2,83	

*) Faste drænedede gulve med 2 pct. fald mod langsgående dræn. Gulvet/gangarealet rengøres mekanisk med et skraberanlæg hver anden time. Skraberens afleverer gødningen i en eller flere tværkanaler eller i en langsgående skrabe kanal i midten af gangen. Gulvets samlede lysåbningsareal (spalteåbning) må maksimalt udgøre 5% af gangarealet.

For hver 100 kg energikorrigeret mælk (EKM), som produceres mere eller mindre end 9629 kg EKM pr. årsko, tillægges eller fratrækkes 0,55 % af kvælstoffet og fosforet i gødningen.

Korrektion af N-mængde ved afvigende ydelse, fodermængde og -sammensætning. Der korrigeres med følgende faktor:

$((\text{FE pr. årsko} \times \text{g råprotein pr. FE}/6250) - (\text{kg mælk pr. årsko} \times \% \text{ protein i mælk}/638) - 1,73) / 141,75$

Korrektion for P-mængde ved afvigende ydelse, fodermængde og -sammensætning. Der korrigeres med følgende faktor:

$((\text{FE pr. årsko} \times \text{g P}/\text{FE}/1000) - (\text{kg mælk pr. årsko} \times 0,00096) - 0,49) / 19,66$

1 årsko, Jersey
Forudsætninger:

Mælkeydelse, kg mælk/årsko	6787
Mælkeprotein, kg/årsko	279
Mælkeprotein, %	4,11
FE pr. årsko	6023

Råprotein, g pr. FE	172
Ford. råprotein, g pr. FE	129
Fosfor, g pr. FE:	4,15
Fodereffektivitet, %	84,0

Ab dyr, udskilt i alt:

Mængde	20,5 ton
N	120,9 kg (64,9+56,0)
P	17,4 kg
K	79,4 kg

Mængden ab lager		Ton gødning	Tørstof, pct.	Indhold i alt				Indhold pr. ton gødning				Emission
Staldsystem	Gødningstype			Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K	Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K	Kg N (ammoniak)
Bindestald med grebning	Staldgødning Ajle	9,30	20,0	56,94	14,23	15,916	23,97	6,12	1,53	1,71	2,58	10.15 (5.61+4.54)
		11,91	3,4	48,77	43,90	1,655	60,01	4,10	3,69	0,14	5,04	
Bindestald med riste	Gylle	24,63	8,7	117,34	70,41	17,571	83,99	4,76	2,86	0,71	3,41	5.16 (3.36+1.79)
Sengestald med fast gulv	Gylle	24,32	8,0	108,67	65,20	17,423	80,78	4,47	2,68	0,72	3,32	12.74 (11.22+1.53)
Sengestald med spalter (kanal, linespil)	Gylle	24,32	8,0	113,01	67,80	17,423	80,78	4,65	2,79	0,72	3,32	8.41 (6.73+1.68)
Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Gylle	24,32	8,0	110,84	66,50	17,423	80,78	4,56	2,73	0,72	3,32	10.57 (8.97+1.60)
Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajlefløb *)	Gylle	24,32	8,0	115,17	69,10	17,423	80,78	4,73	2,84	0,72	3,32	6.24 (4.49+1.75)
Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	13,08	30,0	125,59	25,12	19,470	125,18	9,60	1,92	1,49	9,57	8.61 (7.26+1.36)
Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse Gylle	10,03	28,7	78,37	15,67	12,104	84,26	7,82	1,56	1,21	8,40	10.30 (8.84+1.46)
		10,71	6,9	43,28	25,97	6,944	31,76	4,04	2,42	0,65	2,97	
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)	Dybstrøelse Gylle	10,03	28,7	78,37	15,67	12,104	84,26	7,82	1,56	1,21	8,40	8.56 (7.05+1.52)
		10,71	6,9	45,02	27,01	6,944	31,76	4,20	2,52	0,65	2,97	
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Dybstrøelse Gylle	10,03	28,7	78,37	15,67	12,104	84,26	7,82	1,56	1,21	8,40	9.43 (7.94+1.49)
		10,71	6,9	44,15	26,49	6,944	31,76	4,12	2,47	0,65	2,97	
Dybstrøelse, lang ædeplads, fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	Dybstrøelse Gylle	10,03	28,7	78,37	15,67	12,104	84,26	7,82	1,56	1,21	8,40	7.70 (6.15+1.55)
		10,71	6,9	45,88	27,53	6,944	31,76	4,28	2,57	0,65	2,97	

*) Faste drænedede gulve med 2 pct. fald mod langsgående dræn. Gulvet/gangarealet rengøres mekanisk med et skraberanlæg hver anden time. Skrabereren afleverer gødningen i en eller flere tværkanaler eller i en langsgående skrabe kanal i midten af gangen. Gulvets samlede lysåbningsareal (spalteåbning) må maksimalt udgøre 5% af gangarealet.

For hver 100 kg energikorrigeret mælk (EKM), som produceres mere eller mindre end 8735 kg EKM pr. årsko, tillægges eller fratrækkes 0,67 % af kvælstoffet og fosforet i gødningen.

Korrektion af N-mængde ved afvigende ydelse, fodermængde og -sammensætning. Der korrigeres med følgende faktor:

$((\text{FE pr. årsko} \times \text{g råprotein pr. FE}/6250) - (\text{kg mælk pr. årsko} \times \% \text{ protein i mælk}/638) - 1,08) / 120,95$

Korrektion af P-mængde ved afvigende ydelse, fodermængde og -sammensætning. Der korrigeres med følgende faktor:

$((\text{FE pr. årsko} \times \text{g P}/\text{FE}/1000) - (\text{kg mælk pr. årsko} \times 0,00108) - 0,31) / 17,36$

Årsopdræt, 0-6 mdr., småkalv, tung race. Gødningsproduktionen fra 1 stk. årsopdræt (småkalve) er beregnet på baggrund af 365 foderdage	Forudsætninger:	Ab dyr, udskilt i alt:				
		Tung race	Jersey		Tung race	Jersey
	Antal FE	1047	785	Mængde, ton	2,46	1,84
	Råprotein, g pr. FE	199	199	N, kg	26,7	20,0
	Ford. råprotein, g pr. FE	152	152		(7,8+18,9)	(5,8+14,2)

Mængden ab lager		Ton gødning	Tørstof, pct.	Indhold i alt				Indhold pr. ton gødning				Emission
Staldsystem	Gødningstype			Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K	Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K	Kg N (ammoniak)
Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	1,89	30,0	26,68	5,34	3,276	23,98	14,10	2,82	1,73	12,67	1,89 (1,60+0,29)
Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse	1,89	30,0	26,68	5,34	3,276	23,98	14,10	2,82	1,73	12,67	1,89 (1,60+0,29)

Korrektion for afvigende indgangsalder og/eller afgangsalder (mdr.):
Der korrigeres med følgende faktor for både kvælstof og fosfor: (((alder, ind + alder, ud) * 0,0729) + 1,93) / 2,37

Årsopdræt, 0-6 mdr., småkalv, Jersey.
 Gødningsproduktionen fra 1 stk. årsopdræt
 (småkalve) er beregnet på baggrund af 365
 foderdage

Mængden af lager Staldsystem	Gødningstype	Ton gødning	Tørstof, pct.	Indhold i alt				Indhold pr. ton gødning				Emission
				Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K	Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K	Kg N (ammoniak)
Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	1,48	30,0	20,13	4,03	2,473	18,33	13,55	2,71	1,67	12,34	1,42 (1,20+0,22)
Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse	1,48	30,0	20,13	4,03	2,473	18,33	13,55	2,71	1,67	12,34	1,42 (1,20+0,22)

Korrektion for afvigende indgangsalder og/eller afgangsalder (mdr.):

Der korrigeres med følgende faktor for både kvælstof og fosfor: $((\text{alder, ind} + \text{alder, ud}) * 0,0576) + 1,46) / 1,81$

Årsopdræt 6 mdr. til kælving (27 mdr.),

kvier og stude, tung race.

Gødningsproduktionen fra 1 stk. årsopdræt er
beregnet på baggrund af 365 foderdage.

Forudsætninger:

Antal FE 2094

Råprotein, g pr. FE 172

Ford. råprotein, g pr. FE 122

Fosfor, g pr. FE 4,04

Ab dyr, udskilt i alt:

Mængde 5,68 ton

N 50,4 kg (16,6+33,8)

P 6,57 kg

K 48,7 kg

Mængden ab lager Staldsystem	Gødningstype	Ton gødning	Tørstof, pct.	Indhold i alt				Indhold pr. ton gødning				Emission
				Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K	Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K	Kg N (ammoniak)
Bindestald med grebning	Staldgødning	4,51	18,2	21,10	5,28	6,088	16,54	4,67	1,17	1,35	3,66	5,15 (3,39+1,77)
	Ajle	3,17	3,4	23,26	20,93	0,601	34,68	7,35	6,61	0,19	10,96	
Bindestald med riste	Gylle	7,22	12,3	48,14	28,88	6,689	51,22	6,66	4,00	0,93	7,09	3,11 (2,03+1,08)
Sengestald med fast gulv	Gylle	6,44	12,3	43,05	25,83	6,620	49,72	6,68	4,01	1,03	7,72	7,69 (6,77+0,92)
Sengestald med spaltegulv (kanal, line- spil)	Gylle	6,44	12,3	45,67	27,40	6,620	49,72	7,09	4,25	1,03	7,72	5,08 (4,06+1,01)
Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Gylle	6,44	12,3	44,36	26,62	6,620	49,72	6,89	4,13	1,03	7,72	6,38 (5,42+0,97)
Sengestald, fast drænet gulv med skra- ber og ajlefløb *)	Gylle	6,44	12,3	46,98	28,19	6,620	49,72	7,29	4,38	1,03	7,72	3,77 (2,71+1,06)
Dybstrøelse, hele arealet	Dybstrøelse	5,52	30,0	52,62	10,52	7,493	68,66	9,54	1,91	1,36	12,45	3,59 (3,02+0,57)
Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse	4,88	30,0	51,53	10,31	7,340	65,34	10,55	2,11	1,50	13,38	3,58 (3,02+0,56)
Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse	4,20	30,0	33,11	6,62	4,710	45,85	7,89	1,58	1,12	10,93	5,25 (4,52+0,73)
	Gylle	2,65	11,0	17,09	10,25	2,630	19,49	6,45	3,87	0,99	7,36	
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)	Dybstrøelse	4,20	30,0	33,11	6,62	4,710	45,85	7,89	1,58	1,12	10,93	4,20 (3,44+0,76)
	Gylle	2,65	11,0	18,13	10,88	2,630	19,49	6,85	4,11	0,99	7,36	
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Dybstrøelse	4,20	30,0	33,11	6,62	4,710	45,85	7,89	1,58	1,12	10,93	4,73 (3,98+0,74)
	Gylle	2,65	11,0	17,61	10,57	2,630	19,49	6,65	3,99	0,99	7,36	
Spaltegulvbokse	Gylle	7,28	10,0	44,02	26,41	6,574	48,72	6,05	3,63	0,90	6,69	6,38 (5,42+0,97)

*) Faste drænete gulve med 2 pct. fald mod langsgående dræn. Gulvet/gangarealet rengøres mekanisk med et skraberanlæg hver anden time. Skraberens afleverer gødningen i en eller flere tværkanaler eller i en langsgående skrabekanal i midten af gangen. Gulvets samlede lysåbningsareal (spalteåbning) må maksimalt udgøre 5% af gangarealet.

Korrektion for afvigende indgangsalder og/eller afgangsalder (mdr.):

Der korrigeres med følgende faktor for både kvælstof og fosfor: (((alder, ind + alder, ud) * 0,0729) + 1,93) / 4,34

Årsopdræt, 6 mdr. til kælvning (25 mdr.),
kvier og stude, Jersey.

Gødningsproduktionen fra 1 stk. årsopdræt er
beregnet på baggrund af 365 foderdage.

Forudsætninger:

Antal FE	1571
Råprotein, g pr. FE	172
Ford. råprotein, g pr. FE	122
Fosfor, g pr. FE	4,04

Ab dyr, udskilt i alt:

Mængde	4,26 ton
N	37,9 kg (12,4+25,5)
P	4,95 kg
K	36,5 kg

Mængden ab lager Staldsystem	Gødningstype	Ton gødning	Tørstof, pct.	Indhold i alt				Indhold pr. ton gødning				Emission
				Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K	Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K	Kg N (ammoniak)
Bindestald med grebning	Staldgødning	3,36	18,6	16,26	4,07	4,592	12,93	4,84	1,21	1,37	3,85	3,89 (2,54+1,34)
	Ajle	2,56	3,1	17,08	15,37	0,450	25,61	6,66	6,00	0,18	9,99	
Bindestald med riste	Gylle	5,31	12,7	36,20	21,72	5,043	38,54	6,82	4,09	0,95	7,26	2,34 (1,53+0,81)
Sengestald med fast gulv	Gylle	4,64	12,7	32,31	19,38	4,981	37,21	6,97	4,18	1,07	8,03	5,78 (5,09+0,69)
Sengestald med spaltegulv (kanal, line- spil)	Gylle	4,64	12,7	34,27	20,56	4,981	37,21	7,39	4,44	1,07	8,03	3,82 (3,05+0,76)
Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Gylle	4,64	12,7	33,29	19,97	4,981	37,21	7,18	4,31	1,07	8,03	4,80 (4,07+0,73)
Sengestald, fast drænet gulv med skra- ber og ajlefløb *)	Gylle	4,64	12,7	35,26	21,15	4,981	37,21	7,60	4,56	1,07	8,03	2,83 (2,04+0,80)
Dybstrøelse, hele arealet	Dybstrøelse	4,45	30,0	40,07	8,01	5,717	53,16	9,00	1,80	1,28	11,94	2,70 (2,27+0,43)
Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse	3,82	30,0	38,97	7,79	5,564	49,84	10,20	2,04	1,46	13,04	2,69 (2,27+0,42)
Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse	3,31	30,0	25,14	5,03	3,583	35,22	7,61	1,52	1,08	10,66	3,95 (3,40+0,55)
	Gylle	2,10	10,4	12,83	7,70	1,980	14,62	6,11	3,67	0,94	6,96	
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)	Dybstrøelse	3,31	30,0	25,14	5,03	3,583	35,22	7,61	1,52	1,08	10,66	3,16 (2,58+0,58)
	Gylle	2,10	10,4	13,62	8,17	1,980	14,62	6,48	3,89	0,94	6,96	
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Dybstrøelse	3,31	30,0	25,14	5,03	3,583	35,22	7,61	1,52	1,08	10,66	3,55 (2,99+0,56)
	Gylle	2,10	10,4	13,23	7,94	1,980	14,62	6,30	3,78	0,94	6,96	
Spaltegulvbokse	Gylle	5,46	10,0	33,06	19,84	4,951	36,55	6,06	3,63	0,91	6,69	4,80 (4,07+0,73)

*) Faste drænedede gulve med 2 pct. fald mod langsgående dræn. Gulvet/gangarealet rengøres mekanisk med et skraberanlæg hver anden time. Skraberens afleverer gødningen i en eller flere tværkanaler eller i en langsgående skrabekanal i midten af gangen. Gulvets samlede lysåbningsareal (spalteåbning) må maksimalt udgøre 5% af gangarealet.

Korrektion for afvigende indgangsalder og/eller afgangsalder (mdr.):

Der korrigeres med følgende faktor for både kvælstof og fosfor: (((alder, ind + alder, ud) * 0,0576) + 1,46) / 3,25

**1 produceret tyrekalv, 0-6 mdr.,
tung race**

Forudsætninger:

Antal FE	619
Råprotein, g pr. FE	169
Ford. råprotein, g pr. FE	127
Fosfor, g pr. FE	4,4
Indgangsvægt, kg	40
Afgangsvægt, kg	220
Tilvækst, kg pr. mdr.	30

Ab dyr, udskilt i alt:

Mængde	1,28 ton
N	11,6 kg (4,16+7,45)
P	1,20 kg
K	8,89 kg

Mængden ab lager Staldsystem	Gødningstype	Ton gødning	Tørstof, pct.	Indhold i alt				Indhold pr. ton gødning				Emission
				Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K	Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K	Kg N (ammoniak)
Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	0,96	30,0	11,74	2,35	1,353	12,33	12,26	2,45	1,41	12,87	0,82 (0,70+0,13)
Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse	0,96	30,0	11,74	2,35	1,353	12,33	12,26	2,45	1,41	12,87	0,82 (0,70+0,13)

Korrektion for afvigende indgangs- og/eller afgangsvægt (kg):

$(1,825 \times (\text{vægt, afgang} - \text{vægt, ind}) + 0,00605 \times ((\text{vægt, afgang})^2 - (\text{vægt, ind})^2)) / 612$

Korrektion for afvigende tilvækst, fodermængde og sammensætning:

for kvælstof: $((\text{FE pr. produceret tyr fra indgang til afgang} \times \text{g råprotein pr. FE}/6250 - (\text{kg tilvækst} \times 0,0285)) / 11,6$

for fosfor: $((\text{FE pr. produceret tyr fra indgang til afgang} \times \text{g fosfor pr. FE}/1000 - (\text{kg tilvækst} \times 0,0085)) / 1,2$

1 produceret tyrekalv, 0-6 mdr., Jersey

Forudsætninger:

Antal FE	442
Råprotein, g pr. FE	169
Ford. råprotein, g pr. FE	127
Fosfor, g pr. FE	4,4
Indgangsvægt, kg	25
Afgangsvægt, kg	145
Tilvækst, kg pr. mdr.	20

Ab dyr, udskilt i alt:

Mængde	0,91 ton
N	8,53 kg (2,97+5,56)
P	0,92 kg
K	6,36 kg

Mængden ab lager Staldsystem	Gødningstype	Ton gødning	Tørstof, pct.	Indhold i alt				Indhold pr. ton gødning				Emission
				Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K	Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K	Kg N (ammoniak)
Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	0,74	30,0	8,69	1,74	1,050	9,11	11,75	2,35	1,42	12,31	0,61 (0,51+0,09)
Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse	0,74	30,0	8,69	1,74	1,050	9,11	11,75	2,35	1,42	12,31	0,61 (0,51+0,09)

Korrektion for afvigende indgangs- og/eller afgangsvægt (kg):

$(2,308 \times (\text{vægt, afgang} - \text{vægt, ind}) + 0,00676 \times ((\text{vægt, afgang})^2 - (\text{vægt, ind})^2)) / 415$

Korrektion for afvigende tilvækst, fodermængde og sammensætning:

for kvælstof: $((\text{FE pr. produceret tyr fra indgang til afgang} \times \text{g råprotein pr. FE}/6250 - (\text{kg tilvækst} \times 0,0285)) / 8,5$

for fosfor: $((\text{FE pr. produceret tyr fra indgang til afgang} \times \text{g fosfor pr. FE}/1000 - (\text{kg tilvækst} \times 0,0085)) / 0,9$

Ungtyre, 6 mdr. til slagtning (440 kg),
tung race, (1 produceret ungtyr)

Forudsætninger:

Tilvækst, kg	220
Antal FE	1280
Råprotein, g pr. FE	145
Ford. råprotein, g pr. FE	105
Fosfor, g pr. FE	4,2
Indgangsvægt, kg	220
Afgangsvægt, kg	440
Tilvækst, kg pr. mdr.	33

Ab dyr, udskilt i alt:

Mængde	2,82 ton
N	24,3 kg (8,2+16,1)
P	3,79 kg
K	12,4 kg

Mængden ab lager Staldsystem	Gødningstype	Ton gødning	Tørstof pct.	Indhold i alt				Indhold pr. ton gødning				Emission
				Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K	Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K	Kg N (ammoniak)
Bindestald med grebning	Staldgødning	1,97	20,6	12,38	3,09	3,539	7,13	6,30	1,57	1,80	3,63	2,54 (1,61+0,93)
	Ajle	1,43	3,1	9,14	8,23	0,340	7,11	6,39	5,75	0,24	4,97	
Bindestald med riste	Gylle	3,40	12,8	23,46	14,08	3,878	14,24	6,91	4,15	1,14	4,19	1,48 (0,97+0,51)
Sengestald med fast gulv	Gylle	2,94	12,3	20,90	12,54	3,826	13,11	7,10	4,26	1,30	4,45	3,66 (3,22+0,44)
Sengestald med spaltegulv (kanal, line- spil)	Gylle	2,94	12,3	22,14	13,29	3,826	13,11	7,52	4,51	1,30	4,45	2,42 (1,93+0,48)
Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Gylle	2,94	12,3	21,52	12,91	3,826	13,11	7,31	4,39	1,30	4,45	3,04 (2,58+0,46)
Sengestald, fast drænet gulv med skra- ber og ajlefløb *)	Gylle	2,94	12,3	22,77	13,66	3,826	13,11	7,73	4,64	1,30	4,45	1,79 (1,29+0,50)
Dybstrøelse, hele arealet	Dybstrøelse	2,55	30,0	25,34	5,07	4,230	21,87	9,93	1,99	1,66	8,57	1,73 (1,46+0,27)
Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse	2,27	30,0	24,84	4,97	4,161	20,37	10,96	2,19	1,84	8,99	1,73 (1,46+0,27)
Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse	1,92	30,0	15,88	3,18	2,633	15,17	8,26	1,65	1,37	7,90	2,51 (2,16+0,35)
	Gylle	1,41	8,9	8,26	4,95	1,517	4,94	5,85	3,51	1,08	3,51	
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)	Dybstrøelse	1,92	30,0	15,88	3,18	2,633	15,17	8,26	1,65	1,37	7,90	2,01 (1,65+0,36)
	Gylle	1,41	8,9	8,76	5,25	1,517	4,94	6,21	3,72	1,08	3,51	
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Dybstrøelse	1,92	30,0	15,88	3,18	2,633	15,17	8,26	1,65	1,37	7,90	2,26 (1,91+0,36)
	Gylle	1,41	8,9	8,51	5,10	1,517	4,94	6,03	3,62	1,08	3,51	
Spaltegulvbokse	Gylle	3,11	10,1	21,27	12,76	3,792	12,36	6,84	4,11	1,22	3,98	3,04 (2,58+0,46)

*) Faste drænedes gulve med 2 pct. fald mod langsgående dræn. Gulvet/gangarealet rengøres mekanisk med et skraberanlæg hver anden time. Skraberens afleverer gødningen i en eller flere tværkanaler eller i en langsgående skrabekanal i midten af gangen. Gulvets samlede lysåbningsareal (spalteåbning) må maksimalt udgøre 5% af gangarealet.

Korrektion for afvigende indgangs- og/eller afgangsvægt kg). Der korrigeres med følgende faktor:

$$(1,825 \times (\text{vægt, afgang} - \text{vægt, ind}) + 0,00605 \times (\text{vægt, afgang}^2 - \text{vægt, ind}^2)) / 1280$$

Korrektion af N-mængde ved afvigende tilvækst, fodermængde og -sammensætning. Der korrigeres med følgende faktor:

$$((\text{FE pr. prod. tyr 6 mdr. til afgang} \times \text{g råprotein pr. FE/6250}) - (\text{kg tilvækst} \times 0,0245)) / 24,3$$

Korrektion af P-mængde ved afvigende tilvækst, fodermængde og -sammensætning. Der korrigeres med følgende faktor:

$$((\text{FE pr. prod. tyr 6 mdr. til afgang} \times \text{g P/FE/1000}) - (\text{kg tilvækst} \times 0,0072)) / 3,8$$

Ungtyre, 6 mdr. til slagtning (328 kg) Jersey,
(1 prod. ungtyr)

Forudsætninger:

Tilvækst, kg	183
Antal FE	1008
Råprotein, g pr. FE	145
Ford. råprotein, g pr. FE	105
Fosfor, g pr. FE	4,2
Indgangsvægt, kg	145
Afgangsvægt, kg	328
Tilvækst, kg pr. mdr.	28

Ab dyr, udskilt i alt:

Mængde	2,22 ton
N	18,9 kg (6,5+12,4)
P	2,91 kg
K	9,71 kg

Mængden ab lager Staldsystem	Gødningstype	Ton gødning	Tørstof, pct.	Indhold i alt				Indhold pr. ton gødning				Emission
				Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K	Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K	Kg N (ammoniak)
Bindestald med grebning	Staldgødning	1,51	21,2	9,74	2,43	2,721	5,66	6,44	1,61	1,80	3,74	1,97 (1,24+0,73)
	Ajle	1,12	3,1	7,00	6,30	0,262	5,55	6,26	5,63	0,23	4,96	
Bindestald med riste	Gylle	3,18	10,8	18,26	10,95	2,983	11,21	5,74	3,44	0,94	3,52	1,14 (0,75+0,40)
Sengestald med fast gulv	Gylle	2,20	12,7	16,23	9,74	2,937	10,21	7,38	4,43	1,34	4,64	2,83 (2,49+0,34)
Sengestald med spaltegulv (kanal, line- spil)	Gylle	2,20	12,7	17,19	10,32	2,937	10,21	7,82	4,69	1,34	4,64	1,87 (1,49+0,37)
Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Gylle	2,20	12,7	16,71	10,03	2,937	10,21	7,60	4,56	1,34	4,64	2,35 (1,99+0,36)
Sengestald, fast drænet gulv med skra- ber og ajle afløb *)	Gylle	2,20	12,7	17,68	10,61	2,937	10,21	8,04	4,82	1,34	4,64	1,38 (1,00+0,39)
Dybstrøelse, hele arealet	Dybstrøelse	1,97	30,0	19,65	3,93	3,248	16,96	10,00	2,00	1,65	8,63	1,35 (1,13+0,21)
Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse	1,73	30,0	19,24	3,85	3,191	15,71	11,14	2,23	1,85	9,10	1,34 (1,13+0,21)
Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse	1,45	30,0	12,25	2,45	2,014	11,58	8,47	1,69	1,39	8,01	1,94 (1,68+0,27)
	Gylle	1,18	8,4	6,43	3,86	1,166	3,88	5,46	3,28	0,99	3,30	
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)	Dybstrøelse	1,45	30,0	12,25	2,45	2,014	11,58	8,47	1,69	1,39	8,01	1,56 (1,28+0,28)
	Gylle	1,18	8,4	6,81	4,09	1,166	3,88	5,79	3,47	0,99	3,30	
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Dybstrøelse	1,45	30,0	12,25	2,45	2,014	11,58	8,47	1,69	1,39	8,01	1,75 (1,48+0,27)
	Gylle	1,18	8,4	6,62	3,97	1,166	3,88	5,63	3,38	0,99	3,30	
Spaltegulvbokse	Gylle	2,52	9,8	16,54	9,93	2,914	9,71	6,56	3,94	1,16	3,85	2,35 (1,99+0,36)

*) Faste drænedede gulve med 2 pct. fald mod langsgående dræn. Gulvet/gangarealet rengøres mekanisk med et skraberanlæg hver anden time. Skraberanlæg afleverer gødningen i en eller flere tværkanaler eller i en langsgående skrabekanal i midten af gangen. Gulvets samlede lysåbningsareal (spalteåbning) må maksimalt udgøre 5% af gangarealet.

Korrektion for afvigende afgangsvægt. Der korrigeres med følgende faktor:

$$(2,308 \times (\text{vægt, afgang} - \text{vægt, ind}) + 0,00676 \times (\text{vægt, afgang}^2 - \text{vægt, ind}^2)) / 1008$$

Korrektion for N-mængde ved afvigende tilvækst, fodermængde og -sammensætning. Der korrigeres med følgende faktor:

$$((\text{FE pr. prod. tyr 6 mdr. til afgang} \times \text{g råprotein pr. FE/6250}) - (\text{kg tilvækst} \times 0,0245)) / 18,9$$

Korrektion af P-mængde ved afvigende tilvækst, fodermængde og -sammensætning. Der korrigeres med følgende faktor:

$$((\text{FE pr. prod. tyr 6 mdr. til afgang} \times \text{g P/FE/1000}) - (\text{kg tilvækst} \times 0,0072)) / 2,9$$

Ammekøer, 1 årsko under 400 kg

Forudsætninger:

Antal FE 1525
 Råprotein, g pr. FE 207
 Ford. råprotein, g pr. FE 151
 Fosfor, g pr. FE 3,6

Ab dyr, udskilt i alt:

Mængde 5,08 ton
 N 43,6 kg (13,5+30,1)
 P 4,14 kg
 K 44,0 kg

Mængden af lager Staldsystem	Gødningstype	Ton gødning ¹⁾	Tørstof, pct. ²⁾	Indhold i alt				Indhold pr. ton gødning				Emission
				Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K	Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K	Kg N (ammoniak)
Bindestald med grebning	Staldgødning	2,61	22,8	14,55	3,64	3,724	10,25	5,58	1,40	1,43	3,93	4.41 (3.01+1.40)
	Ajle	2,86	3,8	23,74	21,37	0,479	35,08	8,31	7,48	0,17	12,28	
Bindestald med riste	Gylle	5,50	12,1	41,33	24,80	4,202	45,33	7,51	4,51	0,76	8,24	2.77 (1.81+0.96)
Sengestald med spaltegulv (kanal, line- spil)	Gylle	5,02	12,1	39,28	23,57	4,160	44,42	7,82	4,69	0,83	8,85	4.51 (3.61+0.90)
Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl el. ringkanal)	Gylle	5,02	12,1	38,12	22,87	4,160	44,42	7,59	4,56	0,83	8,85	5.68 (4.82+0.86)
Sengestald, fast drænet gulv med skra- ber og ajleafføb	Gylle	5,02	12,1	40,44	24,27	4,160	44,42	8,06	4,83	0,83	8,85	3.35 (2.41+0.94)
Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	6,99	30,0	44,36	8,87	4,767	57,59	6,35	1,27	0,68	8,24	3.10 (2.62+0.48)
Dybstrøelse (kort ædeplads med fast gulv)	Dybstrøelse	6,42	30,0	43,80	8,76	4,689	55,88	6,83	1,37	0,73	8,71	3.09 (2.62+0.47)
Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse	4,88	30,0	27,29	5,46	2,954	36,59	5,59	1,12	0,61	7,50	4.60 (3.98+0.62)
	Gylle	3,35	6,9	14,72	8,83	1,656	17,59	4,39	2,63	0,49	5,25	
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)	Dybstrøelse	4,88	30,0	27,29	5,46	2,954	36,59	5,59	1,12	0,61	7,50	3.67 (3.02+0.66)
	Gylle	3,35	6,9	15,65	9,39	1,656	17,59	4,67	2,80	0,49	5,25	
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Dybstrøelse	4,88	30,0	27,29	5,46	2,954	36,59	5,59	1,12	0,61	7,50	4.14 (3.50+0.64)
	Gylle	3,35	6,9	15,18	9,11	1,656	17,59	4,53	2,72	0,49	5,25	

Ved opgørelse af fodermængde og indhold af råprotein i foderet skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen:

$((\text{FE pr årsko} * \text{g råprotein pr FE}/6250) - 6,78) / 43,64$

Ved opgørelse af fodermængde og indhold af fosfor i foderet skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen:

$((\text{FE pr årsko} * \text{g P pr FE}/1000) - 1,35) / 4,14$

¹⁾ Gødning afsat under afgræsning regnes som afsat på stald. Lagerbehov kan estimeres på baggrund af antal dage på stald.

²⁾ Tørstofprocent for den del af gødningen, som afsættes på stald i vinterperioden

Ammekøer, 1 årsko 400-600 kg

Forudsætninger:

Antal FE 2207
 Råprotein, g pr. FE 207
 Ford. råprotein, g pr. FE 151
 Fosfor, g pr. FE 3,6

Ab dyr, udskilt i alt:

Mængde 7,35 ton
 N 63,6 kg (19,6+44,0)
 P 6,06 kg
 K 63,8 kg

Mængden ab lager Staldsystem	Gødningstype	Ton gødning 1)	Tørstof, pct. 2)	Indhold i alt				Indhold pr. ton gødning				Emission
				Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K	Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K	Kg N (ammoniak)
Bindestald med grebning	Staldgødning	3,72	22,8	20,63	5,16	5,403	14,22	5,54	1,39	1,45	3,82	6.42 (4.40+2.02)
	Ajle	4,17	3,8	35,17	31,65	0,739	51,39	8,42	7,58	0,18	12,31	
Bindestald med riste	Gylle	7,88	12,1	60,19	36,11	6,142	65,61	7,64	4,58	0,78	8,33	4.05 (2.64+1.41)
Sengestald med spaltegulv (kanal, line- spil)	Gylle	7,28	12,1	57,25	34,35	6,090	64,48	7,87	4,72	0,84	8,86	6.60 (5.28+1.32)
Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl el. ringkanal)	Gylle	7,28	12,1	55,55	33,33	6,090	64,48	7,63	4,58	0,84	8,86	8.30 (7.05+1.26)
Sengestald, fast drænet gulv med skra- ber og ajle afløb	Gylle	7,28	12,1	58,95	35,37	6,090	64,48	8,10	4,86	0,84	8,86	4.90 (3.52+1.38)
Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	9,59	30,0	64,11	12,82	6,895	81,95	6,68	1,34	0,72	8,54	4.51 (3.82+0.69)
Dybstrøelse (kort ædeplads med fast gulv)	Dybstrøelse	8,83	30,0	63,36	12,67	6,791	79,68	7,18	1,44	0,77	9,03	4.50 (3.82+0.68)
Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse Gylle	6,67 4,85	30,0 6,9	39,36 21,45	7,87 12,87	4,263 2,423	51,90 25,52	5,90 4,42	1,18 2,65	0,64 0,50	7,78 5,26	6.72 (5.81+0.90)
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)	Dybstrøelse Gylle	6,67 4,85	30,0 6,9	39,36 22,81	7,87 13,68	4,263 2,423	51,90 25,52	5,90 4,70	1,18 2,82	0,64 0,50	7,78 5,26	5.36 (4.40+0.95)
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Dybstrøelse Gylle	6,67 4,85	30,0 6,9	39,36 22,13	7,87 13,28	4,263 2,423	51,90 25,52	5,90 4,56	1,18 2,74	0,64 0,50	7,78 5,26	6.04 (5.11+0.93)

Ved opgørelse af fodermængde og indhold af råprotein i foderet skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen:

$((\text{FE pr årsko} * \text{g råprotein pr FE}/6250) - 9,33) / 63,62$

Ved opgørelse af fodermængde og indhold af fosfor i foderet skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen:

$((\text{FE pr årsko} * \text{g P pr FE}/1000) - 1,89) / 6,06$

¹⁾ Gødning afsat under afgræsning regnes som afsat på stald. Lagerbehov kan estimeres på baggrund af antal dage på stald.

²⁾ Tørstofprocent for den del af gødningen, som afsættes på stald i vinterperioden.

Ammekøer, 1 årsko over 600 kg

Forudsætninger:

Antal FE	2502
Råprotein, g pr. FE	207
Ford. råprotein, g pr. FE	151
Fosfor, g pr. FE	3,6

Ab dyr, udskilt i alt:

Mængde	8,33 ton
N	72,4 kg (22,2+50,2)
P	6,91 kg
K	72,5 kg

Mængden ab lager Staldsystem	Gødningstype	Ton gødning 1)	Tørstof, pct. 2)	Indhold i alt				Indhold pr. ton gødning				Emission
				Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K	Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K	Kg N (ammoniak)
Bindestald med grebning	Staldgødning	4,15	22,8	22,66	5,66	6,065	15,15	5,47	1,37	1,46	3,66	7,29 (5.02+2.27)
	Ajle	4,80	3,8	40,80	36,72	0,926	59,11	8,51	7,66	0,19	12,32	
Bindestald med riste	Gylle	8,81	12,1	68,41	41,05	6,991	74,27	7,77	4,66	0,79	8,43	4,62 (3.01+1.60)
Sengestald med spaltegulv (kanal, linespil)	Gylle	8,20	12,1	65,12	39,07	6,939	73,13	7,94	4,76	0,85	8,92	7,53 (6.03+1.50)
Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl el. ringkanal)	Gylle	8,20	12,1	63,18	37,91	6,939	73,13	7,70	4,62	0,85	8,92	9,47 (8.03+1.43)
Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	Gylle	8,20	12,1	67,06	40,23	6,939	73,13	8,18	4,91	0,85	8,92	5,59 (4.02+1.57)
Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	10,06	30,0	72,15	14,43	7,744	90,61	7,17	1,43	0,77	9,01	5,12 (4.34+0.78)
Dybstrøelse (kort ædeplads med fast gulv)	Dybstrøelse	9,30	30,0	71,40	14,28	7,639	88,34	7,68	1,54	0,82	9,50	5,12 (4.34+0.77)
Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse	6,95	30,0	44,18	8,84	4,772	57,09	6,36	1,27	0,69	8,21	7,65 (6.62+1.02)
	Gylle	5,50	6,9	24,40	14,64	2,763	28,98	4,44	2,66	0,50	5,27	
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)	Dybstrøelse	6,95	30,0	44,18	8,84	4,772	57,09	6,36	1,27	0,69	8,21	6,10 (5.02+1.08)
	Gylle	5,50	6,9	25,95	15,57	2,763	28,98	4,72	2,83	0,50	5,27	
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Dybstrøelse	6,95	30,0	44,18	8,84	4,772	57,09	6,36	1,27	0,69	8,21	6,87 (5.82+1.05)
	Gylle	5,50	6,9	25,18	15,11	2,763	28,98	4,58	2,75	0,50	5,27	

Ved opgørelse af fodermængde og indhold af råprotein i foderet skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen:

$((\text{FE pr årsko} * \text{g råprotein pr FE}/6250) - 10,29) / 72,41$

Ved opgørelse af fodermængde og indhold af fosfor i foderet skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen:

$((\text{FE pr årsko} * \text{g P pr FE}/1000) - 2,10) / 6,91$

¹⁾ Gødning afsat under afgræsning regnes som afsat på stald. Lagerbehov kan estimeres på baggrund af antal dage på stald.

²⁾ Tørstofprocent for den del af gødningen, som afsættes på stald i vinterperioden.

Slagtefjerkrae.

Forudsætninger	Foder pr. produc. dyr, kg	Tilvækst, kg	Protein i foder, pct.	Fosfor i foder, pct.	Kalium i foder, pct.	Ab dyr, udskilt i alt		
						Kg N	Kg P	Kg K
1000 slagtekyllinger, produktionstid 30 dage	2,45	1,63	20,2	0,56	0,87	31,9	7,69	17,2
1000 slagtekyllinger, produktionstid 32 dage	2,77	1,81	20,1	0,555	0,86	36,6	8,68	19,3
1000 slagtekyllinger, produktionstid 35 dage	3,33	2,09	20,0	0,552	0,86	46,0	11,5	23,4
1000 slagtekyllinger, produktionstid 40 dage	4,35	2,55	19,8	0,546	0,85	63,9	15,3	30,6
1000 skrabekyllinger, produktionstid 56 dage	5,52	2,40	15,0	0,69	0,70	62,9	30,2	32,6
1000 økologiske slagte- kyllinger, produktionstid 81 dage	6,99	2,15	16,9	0,69	0,70	126,6	41,1	43,5
100 kalkuner, tunge, hunner, produktionstid 112 dage	24,3	9,70	19,6	0,79	0,84	48,1	12,7	17,7
100 kalkuner, tunge, hanner, produktionstid 147 dage	50,7	19,1	17,6	0,71	0,77	87,8	23,2	33,7
100 ænder, produktionstid 52 dage	9,75	3,73	16,8	0,65	0,75	17,3	4,29	6,45
100 gæs, produktionstid 91 dage	28,0	6,50	16,0	0,70	0,60	56,1	16,0	15,3

Slagtekyllinger, 1000 stk.

Mængden ab lager Staldsystem	Gødningstype	Ton gødning	Tørstof, pct.	Indhold i alt				Indhold pr. ton gødning				Emission
				Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K	Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K	Kg N (ammoniak)
Slagtekyllinger (25 dyr/m ²), produktionstid 30 dage	Dybstrøelse	1,02	48,0	25,25	7,57	7,706	17,62	24,82	7,45	7,58	17,32	4.26 (2.23+2.03)
Slagtekyllinger (25 dyr/m ²), produktionstid 32 dage	Dybstrøelse	1,14	48,0	28,93	8,68	8,694	19,67	25,29	7,59	7,60	17,19	4.88 (2.56+2.32)
Slagtekyllinger (25 dyr/m ²), produktionstid 35 dage	Dybstrøelse	1,37	48,0	36,30	10,89	11,502	23,79	26,56	7,97	8,42	17,41	6.13 (3.22+2.91)
Slagtekyllinger (25 dyr/m ²), produktionstid 40 dage	Dybstrøelse	1,77	48,0	50,41	15,12	15,353	30,98	28,45	8,54	8,67	17,48	8.52 (4.47+4.05)
Skrabekyllinger (10 dyr/m ²), produktionstid 56 dage	Dybstrøelse	2,41	48,0	49,01	14,70	30,255	34,52	20,31	6,09	12,54	14,31	9.59 (5.66+3.93)
Økologiske slagtekyllinger med friareal (10 dyr/m ²), produktionstid 81 dage	Dybstrøelse Udeareal	4,51 0,36	50,0 50,0	93,22 12,66	27,97 0,00	37,877 4,112	58,00 4,35	20,65 35,50	6,20 0,00	8,39 11,53	12,85 12,21	17.74 (10.26+7.48)

Slagtefjerkræ, 100 stk.

Mængden ab lager Staldsystem	Gødningstype	Ton gødning	Tørstof, pct.	Indhold i alt				Indhold pr. ton gødning				Emission
				Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K	Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K	Kg N (ammoniak)
Kalkuner, tunge, hunner, produktionstid 112 dage	Dybstrøelse	1,01	48,0	31,77	9,53	12,693	18,41	31,35	9,41	12,53	18,16	12.72 (9.62+3.10)
Kalkuner, tunge, hanner, produktionstid 147 dage	Dybstrøelse	2,02	48,0	57,82	17,35	23,247	34,43	28,56	8,57	11,48	17,01	23.21 (17.56+5.64)
Ænder, produktionstid 52 dage	Dybstrøelse	1,00	35,0	12,19	3,66	4,431	9,59	12,22	3,67	4,44	9,61	4.64 (3.45+1.19)
Gæs, produktionstid 91 dage	Dybstrøelse	1,96	35,0	37,66	11,30	16,170	18,44	19,26	5,78	8,27	9,43	14.89 (11.22+3.67)

Korrektion for afvigende fodermængde og sammensætning:

Ved afvigende produktionstid (slagtealder _{ny}) eller afvigende produktionsvægt (slagtevægt _{ny}) beregnes korrektionsfaktoren for kvælstof eller fosformængde med nedenstående formler (den fremkomne faktor multipliceres med kvælstof eller fosfor produktionen i den givne kategori)		
<i>Slagtekyllinger</i>		
Produktionstid Kvælstof	Over 30 dage (N-prod. ved 30 dg. ganges med:)	$(1 + (\text{slagtealder}_{\text{ny}} - 30 \text{ dage}) * 0,073)$
	Over 32 dage (N-prod. ved 32 dg. ganges med:)	$(1 + (\text{slagtealder}_{\text{ny}} - 32 \text{ dage}) * 0,085)$
	Over 35 dage (N-prod. ved 35 dg. ganges med:)	$(1 + (\text{slagtealder}_{\text{ny}} - 35 \text{ dage}) * 0,078)$
Produktionsvægt Kvælstof	Levende vægt ved slagtning over 1,59 kg (N-prod. ved 1,59 kg ganges med:)	$(1 + (\text{slagtevægt}_{\text{ny}} - 1,63 \text{ kg}) * 0,815)$
	Levende vægt ved slagtning over 1,81 kg (N-prod. ved 1,81 kg ganges med:)	$(1 + (\text{slagtevægt}_{\text{ny}} - 1,81 \text{ kg}) * 0,913)$
	Levende vægt ved slagtning over 2,08 kg (N-prod. ved 2,08 kg ganges med:)	$(1 + (\text{slagtevægt}_{\text{ny}} - 2,08 \text{ kg}) * 0,847)$
Produktionstid Fosfor	Over 30 dage (N-prod. ved 30 dg. ganges med:)	$(1 + (\text{slagtealder}_{\text{ny}} - 30 \text{ dage}) * 0,064)$
	Over 32 dage (P-prod. ved 32 dg. ganges med:)	$(1 + (\text{slagtealder}_{\text{ny}} - 32) * 0,108)$
	Over 35 dage (P-prod. ved 35 dg. ganges med:)	$(1 + (\text{slagtealder}_{\text{ny}} - 35) * 0,067)$
Produktionsvægt Fosfor	Levende vægt ved slagtning over 1,63 kg (P-prod. ved 1,63 kg ganges med:)	$(1 + (\text{slagtevægt}_{\text{ny}} - 1,63 \text{ kg}) * 0,714)$
	Levende vægt ved slagtning over 1,81 kg (P-prod. ved 1,81 kg ganges med:)	$(1 + (\text{slagtevægt}_{\text{ny}} - 1,81 \text{ kg}) * 1,154)$
	Levende vægt ved slagtning over 2,08 kg (P-prod. ved 2,08 kg ganges med:)	$(1 + (\text{slagtevægt}_{\text{ny}} - 2,08 \text{ kg}) * 0,730)$

Kvælstofmængden korrigeres med følgende faktor (pr. 1000 slagtekyllinger; pr. 100 kalkuner, ænder, gæs):	
Slagtekyllinger, 30 dage	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{prot. pct. i foder} \times 1,6) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 29,0)) / 31,91$
Slagtekyllinger, 32 dage	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{prot. pct. i foder} \times 1,6) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 29,0)) / 36,59$
Slagtekyllinger, 35 dage	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{prot. pct. i foder} \times 1,6) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 29,0)) / 45,95$
Slagtekyllinger, 40 dage	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{prot. pct. i foder} \times 1,6) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 29,0)) / 63,86$
Skrabekyllinger, 56 dage	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{prot. pct. i foder} \times 1,6) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 29,0)) / 62,88$
Øko. kyllinger, 81 dage	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{prot. pct. i foder} \times 1,6) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 29,0)) / 126,61$
Kalkuner, hunner	$((\text{kg foder pr. produceret kalkun} \times \text{prot. pct. i foder} \times 0,16) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kalkun} \times 2,88)) / 48,11$
Kalkuner, hanner	$((\text{kg foder pr. produceret kalkun} \times \text{prot. pct. i foder} \times 0,16) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kalkun} \times 2,88)) / 87,82$
Ænder	$((\text{kg foder pr. produceret and} \times \text{prot. pct. i foder} \times 0,16) - (\text{kg tilvækst pr. produceret and} \times 2,4)) / 17,26$
Gæs	$((\text{kg foder pr. produceret gås} \times \text{prot. pct. i foder} \times 0,16) - (\text{kg tilvækst pr. produceret gås} \times 2,4)) / 56,08$

Fosformængden korrigeres med følgende faktor (pr. 1000 slagtekyllinger; pr. 100 kalkuner, ænder, gæs):	
Slagtekyllinger, 30 dage	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{pct. fosfor i foder} \times 10) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 3,7)) / 7,69$
Slagtekyllinger, 32 dage	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{pct. fosfor i foder} \times 10) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 3,7)) / 8,68$
Slagtekyllinger, 35 dage	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{pct. fosfor i foder} \times 10) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 3,3)) / 11,49$
Slagtekyllinger, 40 dage	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{pct. fosfor i foder} \times 10) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 3,3)) / 15,34$
Skrabekyllinger, 56 dage	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{pct. fosfor i foder} \times 10) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 3,3)) / 30,17$
Øko. kyllinger, 81 dage	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{pct. fosfor i foder} \times 10) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 3,3)) / 41,12$
Kalkuner, hunner	$((\text{kg foder pr. produceret kalkun} \times \text{pct. fosfor i foder}) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kalkun} \times 0,67)) / 12,66$
Kalkuner, hanner	$((\text{kg foder pr. produceret kalkun} \times \text{pct. fosfor i foder}) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kalkun} \times 0,67)) / 23,21$
Ænder	$((\text{kg foder pr. produceret and} \times \text{pct. fosfor i foder}) - (\text{kg tilvækst pr. produceret and} \times 0,55)) / 4,29$
Gæs	$((\text{kg foder pr. produceret gås} \times \text{pct. fosfor i foder}) - (\text{kg tilvækst pr. produceret gås} \times 0,55)) / 16,03$

Høns og hønniker.

Forudsætninger	Produktions- tid, dage	Tilvækst pr. årshøne/ hønnike, kg	Æg prod. pr. årshø- ne, kg	Foder pr. årshøne, kg	Protein i foder, pct.	Fosfor i foder, pct.	Kalium i foder, pct.	Ab dyr, udskilt i alt			
								Ton gødning	Kg N	Kg P	Kg K
Konsumægshøner, bur, 100 års- høner		0,57	19,8	40,3	16,3	0,52	0,74	4,43	67,6	16,6	27,1
Skrabehøner, 100 årshøner		0,60	19,0	44,6	16,2	0,50	0,73	4,91	79,5	18,1	29,9
Fritgående høner, 100 årshøner		0,60	18,8	44,5	16,2	0,50	0,73	4,90	79,6	18,1	29,9
Økologiske høner, 100 årshøner		0,60	18,7	45,3	16,9	0,57	0,61	4,98	86,9	21,7	25,0
HPR-høner, 100 årshøner *)		2,21	14,0	58,4	12,9	0,47	0,58	6,43	88,9	23,2	31,4
Hønniker, konsumæg, 100 pro- ducerede	119	1,29	-	5,76	15,7	0,60	0,73	0,59	10,8	2,59	3,84
Hønniker, HPR, 100 producere- de	119	1,95	-	6,06	14,8	0,68	0,65	0,62	8,72	2,81	3,39

1 årshøne er defineret til at modsvare 365 foderdage

*) Inkl. 0,09 hane pr. årshøne

Høns og hønniker, 100 stk.

Mængden ab lager Staldsystem	Gødningstype	Ton gødning	Tørstof, pct.	Indhold i alt				Indhold pr. ton gødning				Emission
				Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K	Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K	Kg N (ammoniak)
Friland, konsumæg, gulvdrift + gødningskummer	Dybstrøelse	0,38	63,3	15,41	4,62	5,435	9,15	40,07	12,02	14,13	23,79	27.36 (25.07+2.29)
	Staldgødning	1,30	40,0	24,35	8,52	10,853	17,92	18,80	6,58	8,38	13,84	
	Udeareal	0,49	28,0	7,96	0,00	1,809	2,99	16,26	0,00	3,70	6,10	
Friland, konsumæg, gulvdrift uden gødningskummer	Dybstrøelse	1,12	63,3	46,12	13,84	16,288	27,07	41,13	12,34	14,53	24,15	20.46 (17.91+2.55)
	Staldgødning	0,00	40,0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Udeareal	0,49	28,0	7,96	0,00	1,809	2,99	16,26	0,00	3,70	6,10	
Friland, konsumæg, gulvdrift + fler-etagesystem med gødningsbånd	Dybstrøelse	0,26	63,3	10,29	3,09	3,626	6,16	39,30	11,79	13,85	23,53	12.63 (9.55+3.08)
	Staldgødning	2,16	40,0	42,62	14,92	12,662	20,91	19,74	6,91	5,87	9,69	
	Udeareal	0,49	28,0	7,96	0,00	1,809	2,99	16,26	0,00	3,70	6,10	
Økologiske, konsumæg, gulvdrift + fler-etagesystem med gødningsbånd	Dybstrøelse	0,30	63,3	11,36	3,41	4,365	5,63	37,33	11,20	14,34	18,51	31.14 (28.68+2.45)
	Staldgødning	1,54	40,0	31,03	10,86	15,175	17,52	20,17	7,06	9,87	11,39	
	Udeareal	0,50	28,0	8,69	0,00	2,168	2,50	17,44	0,00	4,35	5,02	
Skrabehøner, konsumæg, gulvdrift + gødningskummer	Staldgødning	0,42	63,3	16,91	5,07	5,978	10,00	40,55	12,16	14,34	23,98	30.39 (27.86+2.53)
	Udeareal	1,45	40,0	27,16	9,51	12,126	20,05	18,74	6,56	8,36	13,83	
Skrabehøner, konsumæg, gulvdrift + fler- etagesystem med gødningsbånd	Dybstrøelse	0,32	63,3	12,82	3,84	4,530	7,61	40,24	12,07	14,22	23,88	14.32 (10.93+3.39)
	Staldgødning	2,32	40,0	45,60	15,96	13,574	22,44	19,67	6,89	5,86	9,68	
Burhøns, konsumæg, gødnings- kælder	Staldgødning	1,95	40,0	50,58	17,70	16,614	27,09	25,87	9,06	8,50	13,86	11.09 (8.11+2.98)
Burhøns, konsumæg, bånd	Staldgødning	2,79	40,0	51,73	18,11	16,614	27,09	18,52	6,48	5,95	9,70	9.81 (6.76+3.04)
Burhøns, konsumæg, bånd	Gylle	9,83	12,0	59,64	38,77	16,614	27,09	6,07	3,95	1,69	2,76	7.98 (6.76+1.22)
Rugeæg (HPR-høner), gulvdrift + gødningskummer	Dybstrøelse	1,63	63,3	30,55	9,16	23,184	31,69	18,71	5,61	14,20	19,40	37.23 (35.54+1.69)
Konsum, bure, produktionstid 118 dage	Staldgødning	0,23	40,0	5,48	1,92	2,592	3,84	23,69	8,29	11,19	16,60	4.62 (4.30+0.32)
Konsum, gulvdrift, produktions- tid 118 dage	Dybstrøelse	0,14	48,0	6,99	2,10	2,603	4,09	49,81	14,94	18,55	29,18	3.08 (2.69+0.39)
Rugeæg (hønniker, HPR), gulv- drift, produktionstid 119 dage	Dybstrøelse	0,15	48,0	5,68	1,70	2,822	3,64	38,91	11,67	19,33	24,93	2.50 (2.18+0.31)

Korrektion for afvigende fodermængde og sammensætning (pr. 100 årshøns/100 producerede hønniker):

Kvælstofmængden korrigeres med følgende faktor:	
Fritgående høns	$((\text{kg foder pr. årshøne} \times \text{prot. pct. i foder} \times 0,16) - (\text{kg æg pr. årshøne} \times 1,81) - (\text{kg tilvækst pr. årshøne} \times 2,88)) / 79,6$
Økologiske høns	$((\text{kg foder pr. årshøne} \times \text{prot. pct. i foder} \times 0,16) - (\text{kg æg pr. årshøne} \times 1,81) - (\text{kg tilvækst pr. årshøne} \times 2,88)) / 86,9$
Skrabehøns	$((\text{kg foder pr. årshøne} \times \text{prot. pct. i foder} \times 0,16) - (\text{kg æg pr. årshøne} \times 1,81) - (\text{kg tilvækst pr. årshøne} \times 2,88)) / 79,5$
Burhøns	$((\text{kg foder pr. årshøne} \times \text{prot. pct. i foder} \times 0,16) - (\text{kg æg pr. årshøne} \times 1,81) - (\text{kg tilvækst pr. årshøne} \times 2,88)) / 67,6$
HPR-høner	$((\text{kg foder pr. årshøne} \times \text{prot. pct. i foder} \times 0,16) - (\text{kg æg pr. årshøne} \times 1,81) - (\text{kg tilvækst pr. årshøne} \times 2,88)) / 88,9$
Hønniker, konsum	$((\text{kg foder pr. produceret hønnike} \times \text{prot. pct. i foder} \times 0,16) - (\text{kg tilvækst pr. produceret hønnike} \times 2,88)) / 10,8$
Hønniker, HPR	$((\text{kg foder pr. produceret hønnike} \times \text{prot. pct. i foder} \times 0,16) - (\text{kg tilvækst pr. produceret hønnike} \times 2,88)) / 8,72$

Fosformængden korrigeres med følgende faktor:	
Fritgående høns	$((\text{kg foder pr. årshøne} \times \text{pct. fosfor i foder}) - (\text{kg æg pr. årshøne} \times 0,2) - (\text{kg tilvækst pr. årshøne} \times 0,67)) / 18,1$
Økologiske høns	$((\text{kg foder pr. årshøne} \times \text{pct. fosfor i foder}) - (\text{kg æg pr. årshøne} \times 0,2) - (\text{kg tilvækst pr. årshøne} \times 0,67)) / 21,7$
Skrabehøns	$((\text{kg foder pr. årshøne} \times \text{pct. fosfor i foder}) - (\text{kg æg pr. årshøne} \times 0,2) - (\text{kg tilvækst pr. årshøne} \times 0,67)) / 18,1$
Burhøns	$((\text{kg foder pr. årshøne} \times \text{pct. fosfor i foder}) - (\text{kg æg pr. årshøne} \times 0,2) - (\text{kg tilvækst pr. årshøne} \times 0,67)) / 16,6$
HPR-høner	$((\text{kg foder pr. årshøne} \times \text{pct. fosfor i foder}) - (\text{kg æg pr. årshøne} \times 0,2) - (\text{kg tilvækst pr. årshøne} \times 0,67)) / 23,2$
Hønniker, konsum	$((\text{kg foder pr. produceret hønnike} \times \text{pct. fosfor i foder}) - (\text{kg tilvækst pr. produceret hønnike} \times 0,67)) / 2,6$
Hønniker, HPR.	$((\text{kg foder pr. produceret hønnike} \times \text{pct. fosfor i foder}) - (\text{kg tilvækst pr. produceret hønnike} \times 0,67)) / 2,8$

1 voksen årshest.

	FE pr. dag	Ford. råprot. pr. FE
Under 300 kg	3,1	80
300 kg – mindre end 500 kg	5,2	80
500 kg – mindre end 700 kg	7,0	80
700 kg og derover	8,8	80

Ab dyr, udskilt i alt	Under 300 kg	300 kg – mindre end 500 kg	500 kg – mindre end 700 kg	700 kg og derover
Mængde, ton	2,36	2,92	4,38	5,84
N, kg	23,0	38,0	50,0	63,0
P, kg	4,00	6,00	8,00	10,0
K, kg	21,0	35,0	46,0	58,0

Vægtklasse	Gødnings- type	Ton gødning	Tørstof pct.	Indhold i alt ab lager				Indhold pr. ton gødning				Emission
				Kg N	Kg NH ₄ N	Kg P	Kg K	Kg N	Kg NH ₄ N	Kg P	Kg K	Kg N (ammoniak)
Under 300 kg	Dybstrøelse	2,97	26,0	21,06	5,26	4,633	34,73	7,10	1,77	1,56	11,70	4,18 (3,45+0,73)
300 kg – mindre end 500 kg	Dybstrøelse	4,52	26,0	34,85	8,71	7,055	57,89	7,72	1,93	1,56	12,82	6,90 (5,70+1,20)
500 kg – mindre end 700 kg	Dybstrøelse	5,13	26,0	43,72	10,93	9,055	68,89	8,52	2,13	1,76	13,42	9,01 (7,50+1,51)
700 kg og derover	Dybstrøelse	5,75	26,0	53,34	13,33	11,055	80,89	9,27	2,32	1,92	14,06	11,29 (9,45+1,84)

Får og geder, 1 moderdyr med afkom

Forudsætninger			Ab dyr, udskilt i alt		
	Foderforbrug, FE	Gødningsmængde, ton	N, kg	P, kg	K, kg
Får	728	2,32	16,9	2,81	23,6
Mohairgeder	603	2,73	18,5	2,67	24,2
Kødgeder	667	2,13	16,4	2,15	21,5
Malkegeder	669	2,24	17,0	2,86	19,2

Gødningstype		Ton gødning	Tørstof pct.	Indhold i alt ab lager				Indhold pr. ton gødning				Emission
				Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K	Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K	Kg N (ammoniak)
Får	Dybstrøelse	1,13	34,6	14,57	3,64	3,126	30,46	12,93	3,23	2,77	27,04	3,04 (2,54+0,50)
Mohairgeder	Dybstrøelse	1,21	34,6	15,70	3,92	2,984	31,07	12,96	3,24	2,46	25,64	3,31 (2,77+0,54)
Kødgeder	Dybstrøelse	1,10	34,6	14,13	3,53	2,463	28,38	12,89	3,22	2,25	25,88	2,94 (2,45+0,49)
Malkegeder	Dybstrøelse	1,13	34,6	14,62	3,65	3,176	26,09	12,97	3,24	2,82	23,15	3,06 (2,55+0,50)